

四川省人 - 猪链球菌病疫点消毒处理工作程序

一、疫点范围

人 - 猪链球菌病病例家庭及其畜圈、禽舍等区域；人 - 猪链球菌病病例发病前接触的病、死猪所在家庭及其畜圈、禽舍等区域。

二、准备工作

1、物资准备：灭菌粉、灭菌片、漂白粉，水桶（2只/点）、水瓢、塑料盆，漏斗、普通喷雾器，长卷尺，洁净毛巾（2条）。

2、防护用品：长筒胶靴，乳胶手套，一次性口罩，工作帽，防水工作服。

三、工作程序

1、进入现场前，做好个人防护。

2、进入现场，了解现场需消毒的物品、区域等情况，估计需消毒面积。

3、了解可能被消毒液损坏的有价值物品，给予覆盖或以其它方法消毒。

4、按需要量配置消毒液，规范开展消毒工作。

（1）按 5000 mg/L 有效氯浓度标准配置喷洒消毒液，用以消毒地面、物表、墙面，每平方米喷洒 100-200 毫升。

消毒程序：进入疫点消毒，按由外向内顺序，喷雾或擦拭消毒门把手、地面、墙壁、家具、厕所等处；从不同房间以及最后退出时，边退边消毒经过的地面。为了保证消毒效果，病家应在 60 分钟后方可进入消毒现场。

（2）按 500 mg/L 有效氯浓度标准配置消毒液，对案板、盆、碗、刀等可能受污染的物品浸泡 30 分钟消毒。

（3）按 10000 mg/L 有效氯浓度标准配置消毒液，与病人的排泄物、呕吐物混匀消毒，其容器以消毒剂浸泡处理，浸泡时间不少于 30 分钟。

（4）对病、死猪用草垫等物包裹，以含 10000 mg/L 有效氯的消毒剂喷洒，充分湿润包裹物；深埋（2 米 ~ 3 米），坑底铺垫含氯石灰或石灰，并远离水源 ≥ 50 米。

（5）病人尸体应消毒火化。

(6) 饮用水消毒：每 100 斤水使用 1 片灭菌片，充分溶化、搅拌。

5、消毒结束后，工作人员应穿长筒胶靴站入盛有消毒液的槽或盆内消毒 5 分钟；以 0.5%的碘伏、75%的酒精棉球擦拭或醋酸氯乙啶手消毒剂喷洒消毒手部；手套、口罩、帽子、工作衣等以密封袋带回焚毁。

四、消毒工作注意事项：

1、消毒工作人员在出发前仔细检查所带消毒剂和用具是否齐全。

2、消毒时不可吸烟、喝水、吃东西，不得随便走出消毒区域，并劝阻无关人员进入疫点。

3、消毒应有条不紊，突出重点。凡应消毒的物品，不得遗漏。严格区分已消毒和未消毒的物品，勿使已消毒的物品被再次污染。

4、消毒完毕应清点所消耗器材、物品，加以整修、补充。

5、嘱咐住户，消毒 1 小时后，打开关闭门窗通风后方可进入；对消毒过的物品进行必要清洗后再使用。

6、作好消毒记录，及时上报。